

Pacienti po opakovaných tepenných rekonstrukčních operacích – obtížná indikace k revizi při život ohrožujících komplikacích

Šilhat Z., Penka I., Hamtilová I., Kysela P., Wasiková S.

Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Toto velmi ožehavé téma jsme zařadili na pořad II. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství z profesních i forenzních důvodů. Čas od času se setkáváme s pacienty, kteří v minulosti podstoupili opakované tepenné rekonstrukční operace. Jedná se především o nemocné, kde byla původní tepenná rekonstrukce indikována v úseku aorto-iliickém nebo aorto-femorálním. Do tohoto souboru nemocných jsou soustředěni ti, u kterých byla původně resekována AAA s náhradou tabulární nebo bifurkační protézou. Dále jsou to pacienti po implantaci bifurkační protézy nebo uni-laterálního graftu.

Jednou ze závažných komplikací implantovaného graftu může být i s odstupem řady let vzniklá komunikace mezi grafterem a střevem, tzv. aorto-/protézo/ enterální píštěl.

S jedním takto složitým případem 63-leté ženy bychom chtěli seznámit dnešní odborné fórum.