

Komplikace po nestandardní augmentaci prsou

Vřeský B.^{1,3}, Dvořáček I.²

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, Fakultní nemocnice Ostrava¹

Ústav soudního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava²

Lékařská fakulta Ostravská univerzita³

Cíl:

Mezi nestandardní a vysoce rizikové patří augmentace prsou přímými olejovými infiltračními metodami. Prezentovaná žena podstoupila augmentační výkon infiltrací parafínovým olejem v zahraničí. Postupně došlo ke komplikacím místním i celkovým, které bylo nutno řešit operačním výkonem – subkutánní mastectomií a lymphadenectomií postižených axilárních uzlin.

Metoda:

Subkutánní mastectomie a lymphadenectomie axilárních uzlin po infiltraci parafínovým olejem za účelem augmentace byla nutná pro defekty prsou, bolestivost, trvalou secernaci, mastitidu a sepsi. Operační výkon byl prováděn s perspektivou následné rekonstrukce prsou. Rekonstrukce pro neschválení zdravotní pojišťovnou nebyla u pacientky provedena. S odstupem více jak 6ti let dochází k výskytu infiltrativních resistencí v oblasti hrudníku, oblasti břišní stěny, pektorální svalů s omezením hybnosti horních končetin v důsledku kontraktur prsních svalů. Zároveň dochází k rozvoji caput meduse v oblasti hrudníku a paží v důsledku obliterace žilního systému axilárních oblastí.

Výsledky:

I přes opakované operační výkony s odstupem několika let po augmentaci parafínovým olejem dochází k progresi infiltrativních změn měkkých tkání způsobených olejovými komponenty parafínu. Tyto postihují pravděpodobně i venosní systém s obliterací. Následné operační výkony jsou paliativní, zaměřené na zlepšení funkce hybnosti horních končetin a snížení bolestivosti vytvářených podkožních granulomů.

Prognosticky je stav nejistý.

Závěr:

Masivní augmentace prsou parafínovým olejem lze považovat za nehumánní, vedoucí k trvalému mutilujícímu poškození a poškození pacienta.