

Augmentace prsou - pozdní infekční komplikace

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, Fakultní nemocnice Ostrava¹

Lékařská fakulta Ostravské univerzity²

Cíl:

Infekční pozdní komplikace po augmentaci prsou způsobené sekundární infekcí implantátů jsou vzácné. *Staphylococcus aureus* bývá nejčastějším patogenem, postiženým způsobuje změnu tvaru prsou a bolestivost.

Řešením je identifikace bakteriální kolonizace, ATB terapie a případně chirurgická intervence.

Metoda:

Kasuistická sdělení pozdních sekundárních infekcí prsních implantátů předkládá možnosti terapie. V závažných případech je nutná chirurgická intervence se zajištěním chráněného koagula dle citlivosti. Nezbytným je vyšetření USG popřípadě CT a NMR.

Operace sleduje sanaci infektu se strategií i opakovaných operačních výkonů vedoucích k optimálnímu výslednému tvaru prsou. Nezbytná je kapsulotomie implantátů, u velkých expanzí prsou bakteriálním výpotkem je nutná redukce kůže prsou. V případech intaktních augmentačních materiálů je možné provést re-augmentaci v jedné době zachovalým implantátem.

Výsledky:

Prezentované kasuistiky podávají přehled o možnosti terapie při pozdních infekčních komplikacích po augmentaci prsou způsobených zlatým *Staphylococem*. Sanace infektu operační cestou a individuální strategie vycházející z peroperačního nálezu vede k optimálnímu kosmetickému výsledku zvolené terapie. Paraklinické předoperační vyšetření – USG, CT, NMR může být v korelaci s peroperačním nálezem.

Závěr:

Infekce implantátů zlatým *Staphylococem* navazují nejčastěji na celkové zánětlivé projevy celkových onemocnění. Jsou to zejména nedostatečně léčeny záněty horních dýchacích cest a jiné, spojené s febriliemi kde nebyla prováděna komplexní ATB terapie.

Doporučujeme preventivní nasazení širokospektrými antibiotik při vzniklých infektech u pacientů po augmentacích prsou. Při známkách již rozvinutých potíží spojených s infektem implantátů bývá nezbytná chirurgická intervence a cílená terapie antibiotiky dle citlivost.